

【膵臓癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
GEM	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8, 15（30分）	28日	軽度リスク	－
GEM Biweekly	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1（30分）	14日	軽度リスク	－
GEM+S1（2投1休）	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8（30分） S-1：80mg/m ² /D1-14	21日	軽度リスク	－
GEM+S1（3投2休）	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8, 15（30分） S-1：80mg/m ² /D1-21	35日	軽度リスク	－
GEM+アブラキサン	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8, 15（30分） アブラキサン：125mg/m ² /D1, 8, 15（30分）	28日	中等度リスク	－
FOLFIRINOX	オキサリプラチン：85mg/m ² /D1（2時間） イリノテカン：180mg/m ² /D1（90分） レボホリナート：200mg/m ² /D1（2時間） フルオロウラシル：400mg/m ² /D1（ボース） フルオロウラシル：2400mg/m ² /D1（46時間持続）	14日	高度リスク	－
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン：85mg/m ² /D1（2時間） イリノテカン：150mg/m ² /D1（90分） レボホリナート：200mg/m ² /D1（2時間） フルオロウラシル：2400mg/m ² /D1（46時間持続）	14日	高度リスク	－
オニバイド+5-FU/I-LV（二次治療以降）	オニバイド：70mg/m ² /D1（90分） （UGT1A1遺伝子多型ホモ型・ダブルヘテロ型：50mg/m ² ） レボホリナート：200mg/m ² /D1（2時間） フルオロウラシル：2400mg/m ² /D1（46時間持続）	14日	中等度リスク	－