

【尿路上皮癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
GDC	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8（30分） ドセタキセル：75mg/m ² /D1（60分） カルボプラチン：AUC5/D1（60分）	21日	中等度リスク （高度に準じた）	—
GEM+CBDC A	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8（30分） カルボプラチン：AUC5/D1（30分）	21日	中等度リスク （高度に準じた）	—
GEM+CDDP	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8, 15（30分） シスプラチン：70mg/m ² /D2（2時間）	28日	高度リスク	—
MEC	メソトレキセート：30mg/m ² /D1, 15（30分） エピルビシン：50mg/m ² /D1（全開で） シスプラチン：100mg/m ² /D2（3時間）	28日	高度リスク	—
M-VAC	メソトレキセート：30mg/m ² /D1, 15, 22（30分） プレオマイシン：3mg/m ² /D2, 15, 22（30分） ドキソルビシン：30mg/m ² /D2（30分） シスプラチン：70mg/m ² /D2（3時間）	28日	高度リスク	—
キイトルーダ（3週毎）	キイトルーダ：200mg/body/D1（30分）	21日	最小度リスク	—
キイトルーダ（6週毎）	キイトルーダ：400mg/body/D1（30分）	42日	最小度リスク	—