

## 【卵巣癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
TC（卵巣・1日間・ハイドレーションなし）		21日	高度リスク	－

## 【軟部腫瘍レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
DXR	ドキシソルピシン：60mg/m <sup>2</sup> /D1（全開で）	21日	高度リスク	－
ハラヴェン	ハラヴェン：1.4mg/m <sup>2</sup> /D1, 8（全開で）	21日	軽度リスク	－

## 【悪性黒色腫レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
オブジーボ（3mg/kg・2週毎）	オブジーボ：3mg/kg/2週毎（未治療・既治療）（30分）	14日	最小度リスク	－
オブジーボ（2mg/kg・3週毎）	オブジーボ：2mg/kg/3週毎（既治療）（30分）	21日	最小度リスク	－
ヤーボイ	ヤーボイ：3mg/kg/D1（90分）	21日	最小度リスク	－

## 【神経内分泌腫瘍レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
ザノサー	ザノサー：1000mg/m <sup>2</sup> /D1（30分） 13週以降1250mg/m <sup>2</sup> , さらに19週以降1500mg/m <sup>2</sup> まで増量可。	7日	高度リスク	－

## 【MSI-High固形癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
キイトルーダ（3週毎）	キイトルーダ：200mg/body/D1（30分）	21日	最小度リスク	－
キイトルーダ（6週毎）	キイトルーダ：400mg/body/D1（30分）	42日	最小度リスク	－

## 【原発不明癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
PTX+CBDCA	パクリタキセル：175mg/m <sup>2</sup> /D1（3時間） カルボプラチン：AUC5/D1（1時間）	21日	中等度リスク （高度に準じた）	レスタミン錠5錠
wCPT-11	イリノテカン：100mg/m <sup>2</sup> /D1, 8, 15（90分）	35日	中等度リスク	－