

## 【非ホジキンリンパ腫レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
リツキシマブ	リツキシマブ：375mg/m <sup>2</sup> /D1	7日	最小度リスク	カロナール500mg レスタミン3錠
ガザイバ	ガザイバ：（1コース目）1000mg/body/D1, 8, 15 ガザイバ：（2コース目以降）1000mg/body/D1	7日 21日	最小度リスク	カロナール650mg レスタミン5錠
CHOP	エンドキサン：750mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） ドキシソルビシン：50mg/m <sup>2</sup> /D1（30分） オンコビン：1.4mg/m <sup>2</sup> /D1（全開で） プレドニゾン内服：100mg/body/D1-5	21日	高度リスク	—
R-CHOP（D1）	エンドキサン：750mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） ドキシソルビシン：50mg/m <sup>2</sup> /D1（30分） オンコビン：1.4mg/m <sup>2</sup> /D1（全開で） リツキシマブ：375mg/m <sup>2</sup> /D1 プレドニゾン内服：100mg/body/D1-5	21日	高度リスク	カロナール500mg レスタミン3錠
CHOP-like2（THP-COP）	エンドキサン：500mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） ピノルビン：30mg/m <sup>2</sup> /D1（30分） オンコビン：1mg/m <sup>2</sup> /D1（全開で） プレドニゾン内服：30mg/m <sup>2</sup> /D1-5	21日	高度リスク	—
トレアキシン（単独療法）	トレアキシン：120mg/m <sup>2</sup> /D1, 2（60分）	21日	中等度リスク	—
トレアキシン（抗CD20抗体併用）	トレアキシン：90mg/m <sup>2</sup> /D1, 2（60分）	28日	中等度リスク	—
イストダックス	イストダックス：14mg/m <sup>2</sup> /D1, 8, 15（4時間）	28日	軽度リスク	—
ポテリジオ	ポテリジオ：1mg/kg/D1（2時間） 8コース	7日	最小度リスク	カロナール500mg レスタミン3錠
アドセトリス+CHP	アドセトリス：1.8mg/kg（MAX180mg）/D1（30分） エンドキサン：750mg/m <sup>2</sup> /D1（2時間） ドキシソルビシン：50mg/m <sup>2</sup> /D1（30分） プレドニゾン内服：100mg/body/D1-5 最大8コース	21日	高度リスク	—