

【乳癌レジメン】

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
CAF	ドキシソルピシン：40-60mg/m ² /D1, 8（全開で） フルオロウラシル：500mg/m ² /D1, 8（15分） エンドキサン：400-600mg/m ² /D1, 8（30分）	28日	高度リスク	-
CE（100）	エピルピシン：100mg/m ² /D1（全開で） エンドキサン：600mg/m ² /D1（30分）	21日	高度リスク	-
CE（60）	エピルピシン：60mg/m ² /D1（全開で） エンドキサン：600mg/m ² /D1（30分）	21日	高度リスク	-
CEF	エピルピシン：60mg/m ² /D1（全開で） フルオロウラシル：500mg/m ² /D1（30分） エンドキサンP内服：100mg/body/D1-14	28日	中等度リスク	-
CMF	メソトレキセート：40mg/m ² /D1, 8（全開で） フルオロウラシル：500mg/m ² /D1, 8（30分） エンドキサンP内服：100mg/body/D1-14	28日	中等度リスク	-
CMF静注	メソトレキセート：40mg/m ² /D1（全開で） フルオロウラシル：500mg/m ² /D1（30分） エンドキサン：600mg/m ² /D1（60分）	21日	中等度リスク	-
DC	ドセタキセル：75mg/m ² /D1（60分） エンドキサン：600mg/m ² /D1（30分）	21日	中等度リスク	-
DOC（60）	ドセタキセル：60mg/m ² /D1（60分）	21日	軽度リスク	-
DOC（75）	ドセタキセル：75mg/m ² /D1（60分）	21日	軽度リスク	-
Dose-Dence CE	エピルピシン：90mg/m ² /D1（全開で） エンドキサン：600mg/m ² /D1（30分） ジールスタ：3.6mg/body/D3（皮下注）	14日	高度リスク	-
Dose-Dence PTX	パクリタキセル：175mg/D1（3時間） ジールスタ：3.6mg/body/D3（皮下注）	14日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
FEC（100）	エピルピシン：100mg/m ² /D1（全開で） フルオロウラシル：500mg/m ² /D1（15分） エンドキサン：500mg/m ² /D1（30分）	21日	高度リスク	-
GEM	ゲムシタビン：1250mg/m ² /D1, 8（30分）	21日	軽度リスク	-
TCbH	ドセタキセル：75mg/m ² /D1（60分） カルボプラチン：AUC6/D1（60分） トラスツズマブ：（初回）8mg/kg/D1（90分） （2回目以降）6mg/kg/D1（90分） 6コース	21日	中等度リスク （高度に準じた）	-
VNB	ロゼウス：25mg/m ² /D1, 8（全開で）	21日	最小度リスク	-
weekly DC（20）	ドセタキセル：20mg/m ² /D1, 8, 15（60分）	28日	軽度リスク	-
weekly PTX	パクリタキセル：70-100mg/D1, 8, 15（60分）	28日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
weekly アブラキサン	アブラキサン：100mg/m ² /D1, 8, 15（30分）	28日	最小度リスク	-
ペバシズマブ+PTX	パクリタキセル：90mg/D1, 8, 15（60分） ペバシズマブ：10mg/kg/D1, 15（60~90分）	28日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
アブラキサン	アブラキサン：260mg/m ² /D1（30分）	21日	軽度リスク	-
エンハーツ	エンハーツ：5.4mg/kg/D1（30分（初回90分））	21日	中等度リスク	-
カドサイラ	カドサイラ：3.6mg/kg/D1（30~90分）	21日	軽度リスク	-

レジメン名	投薬スケジュール（投与時間）	1クール日数	催吐性リスク	経口前投薬
テセントリク+アブラキサン	テセントリク：840mg/body/D1, 15（30～60分） アブラキサン：100mg/m ² /D1, 8, 15（30分）	28日	軽度リスク	－
トラスツズマブ	トラスツズマブ：（初回）4mg/kg/D1（90分） （2回目以降）2mg/kg/D1（60分）	7日	最小度リスク	－
3週毎トラスツズマブ	トラスツズマブ：（初回）8mg/kg/D1（90分） （2回目以降）6mg/kg/D1（90分）	21日	最小度リスク	－
トラスツズマブ+PTX	パクリタキセル：70～100mg/D1, 8, 15（60分） トラスツズマブ：2mg/kg/D1, 8, 15（60分） （初回）4mg/kg	28日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
パージェタ+トラスツズマブ	パージェタ：（初回）840mg/body/D1（60分） （2回目以降）420mg/kg/D1（30分） トラスツズマブ：（初回）8mg/kg/D1（90分） （2回目以降）6mg/kg/D1（90分）	21日	最小度リスク	－
パージェタ+トラスツズマブ+DOC	パージェタ：（初回）840mg/body/D1（60分） （2回目以降）420mg/kg/D1（30分） トラスツズマブ：（初回）8mg/kg/D1（90分） （2回目以降）6mg/kg/D1（90分） ドセタキセル：75mg/m ² /D1（60分）	21日	軽度リスク	－
ハラヴェン	ハラヴェン：4mg/m ² /D1, 8（全開で）	21日	軽度リスク	－
GEM+CBDC A（キイトルーダ併用）	ゲムシタビン：1000mg/m ² /D1, 8（30分） カルボプラチン：AUC2/D1, 8（60分） キイトルーダ併用	21日	中等度リスク	
weeklyPTX（キイトルーダ併用）	パクリタキセル：90mg/D1, 8, 15（60分） キイトルーダ併用	28日	軽度リスク	レスタミン錠5錠
weeklyアブラキサン（キイトルーダ併用）	アブラキサン：100mg/m ² /D1, 8, 15（30分） キイトルーダ併用	28日	軽度リスク	
キイトルーダ（併用・3週毎）	キイトルーダ：200mg/body（3週毎）（30分） GEM+CBDC A・wPTX・wアブラキサン併用	21日	最小度リスク	
キイトルーダ（併用・6週毎）	キイトルーダ：400mg/body（6週毎）（30分） GEM+CBDC A・PTX・アブラキサン併用	42日	最小度リスク	
キイトルーダ+PTX+CBDC A（AUC1.5）	キイトルーダ：200mg/body/D1（30分） パクリタキセル：80mg/D1, 8, 15（60分） カルボプラチン：AUC1.5/D1, 8, 15（60分） 4コース終了後キイトルーダ+CEへ	21日	中等度リスク	レスタミン錠5錠
キイトルーダ+PTX+CBDC A（AUC5）	キイトルーダ：200mg/body/D1（30分） パクリタキセル：80mg/D1, 8, 15（60分） カルボプラチン：AUC5/D1（60分） 4コース終了後キイトルーダ+CEへ	21日	中等度リスク （高度に準じた）	レスタミン錠5錠
キイトルーダ+CE	キイトルーダ：200mg/body/D1（30分） エピルピシン：100mg/m ² /D1（全開で） エンドキサン：600mg/m ² /D1（30分） 4コース終了後、術後キイトルーダ単剤へ	21日	高度リスク	
キイトルーダ（術後・3週毎）	キイトルーダ：200mg/body/D1（30分） 術前キイトルーダ併用療法投与開始から1年間	21日	最小度リスク	
キイトルーダ（術後・6週毎）	キイトルーダ：400mg/body/D1（30分） 術前キイトルーダ併用療法投与開始から1年間	42日	最小度リスク	